



Cheryl Lawrence, MD, FAAP
Medical Director

Office of School Health
42-09 28th St.
Queens, NY 11101-4132

May 2019

Dear parent/guardian,

New York City has updated the school immunization requirements for the 2019-2020 school year. A list of the new school immunization requirements for 2019-2020 is included with this letter. Before the school year begins, you must submit proof of immunization for your children if they are attending child care or school.

All students in child care through grade 12 must meet the requirements for:

- The DTaP (diphtheria- tetanus-pertussis), poliovirus, MMR (measles-mumps-rubella), varicella and hepatitis B vaccines.

Children under age 5 who are enrolled in child care and pre-kindergarten (pre-K) must also meet the requirements for:

- The Hib (*Haemophilus influenzae* type b) and PCV (pneumococcal conjugate) vaccines.
- The influenza (flu) vaccine
 - Children must receive the flu vaccine by December 31, 2019 (ideally, when it becomes available in early fall).

Children in grades 6 through 12 must also meet the requirements for:

- The Tdap booster and MenACWY (meningococcal conjugate) vaccines.

Please review your child's immunization history with your child's health care provider. Their provider can tell you whether additional doses of one or more vaccines are required for your child to attend child care or school this year.

If you have questions about these requirements, please contact your child care center or school's administrative office.

Sincerely,

Cheryl Lawrence, MD, FAAP
Medical Director
Office of School Health

Is Your Child Ready for Child Care or School?

2019-2020 School Year

Learn about required vaccinations in New York City

All students ages 2 months to 18 years in New York City must get the following vaccinations to go to child care or school. Review your child's vaccine needs based on their grade level this school year.

VACCINATIONS	Pre-Kindergarten (Child Care, Head Start, Nursery, 3K or Pre-K)	Kindergarten – Grade 5	Grades 6 – 11	Grade 12
Diphtheria, tetanus and pertussis (DTaP)	4 doses	5 doses or 4 doses ONLY if the fourth dose was received at age 4 years or older or 3 doses ONLY if the child is 7 years or older and the series was started at age 1 year or older	3 doses	
Tetanus, diphtheria and pertussis booster (Tdap)				1 dose (on or after age 11 years)
Polio (IPV/OPV)	3 doses	4 doses or 3 doses if the third dose was received at age 4 years or older	4 doses or 3 doses ONLY if the third dose was received at age 4 years or older	3 doses
Measles, mumps and rubella (MMR)	1 dose			2 doses
Hepatitis B	3 doses	3 doses	3 doses or 2 doses of adult Hepatitis B vaccine (Recombivax HB) if the doses were received at least 4 months apart between the ages of 11 and 15 years	
Varicella (chickenpox)	1 dose	2 doses		1 dose
Meningococcal conjugate (MenACWY)			Grades 7, 8, 9 and 10: 1 dose	2 doses or 1 dose ONLY if the first dose was received at age 16 years or older
Haemophilus influenzae type B conjugate (Hib)	1 to 4 doses Depends on child's age and doses previously received			
Pneumococcal conjugate (PCV)	1 to 4 doses Depends on child's age and doses previously received			
Influenza	1 dose			

The number of vaccine doses your child needs may vary based on age and previous vaccine doses received. Your child may need additional vaccines or vaccine doses if they have certain health conditions. Talk to your doctor if you have questions. For more information, call 311 or visit nyc.gov/health and search for student vaccines.



Department of Health
& Mental Hygiene

Department of
Education



Cheryl Lawrence, MD, FAAP
Medical Director

Office of School Health
42-09 28th St.
Queens, NY 11101-4132

Julio de 2019

Estimado padre/madre o tutor legal:

La Ciudad de Nueva York ha actualizado los requisitos de vacunación escolar para el año 2019-2020. Esta carta incluye una lista de los nuevos requisitos de vacunación escolar para el año 2019-2020. Si sus hijos asistirán a la guardería o a la escuela, debe presentar sus comprobantes de vacunación antes del inicio del año escolar.

Todos los estudiantes desde guardería hasta 12.º grado deben cumplir estos requisitos:

- Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP, por sus siglas en inglés), vacuna contra el virus de la poliomielitis, vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas en inglés), vacuna contra la varicela y vacuna contra la hepatitis B.

Los niños menores de 5 años que estén inscritos en guardería y prekindergarten (pre-K) también deben cumplir estos requisitos:

- Vacuna contra la *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) y la vacuna antineumocócica conjugada (PCV, por sus siglas en inglés).
- Vacuna contra la influenza (gripe).
 - Los niños deben recibir la vacuna contra la gripe antes del 31 de diciembre de 2019 (idealmente, cuando esté disponible a principios del otoño).

Los niños en los grados de 6.º a 12.º también deben cumplir estos requisitos:

- Refuerzo de la vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tdap, por sus siglas en inglés) y la vacuna antimeningocócica conjugada (MenACWY, por sus siglas en inglés).

Revise el historial de vacunación de su hijo con el proveedor de atención de salud de su hijo. Su proveedor puede informarle si es necesario que su hijo reciba dosis adicionales de una o más vacunas para poder asistir a la guardería o a la escuela este año.

Si tiene preguntas sobre estos requisitos, póngase en contacto con la oficina administrativa de la guardería o de la escuela.

Atentamente.

Cheryl Lawrence, MD, FAAP
Directora médica
Oficina de Salud Escolar

¿Su hijo está listo para ir a la guardería o a la escuela?

Obtenga información sobre las vacunas requeridas en la Ciudad de Nueva York

Todos los estudiantes de la Ciudad de Nueva York desde los 2 meses hasta los 18 años deben recibir las siguientes vacunas para ir a guardería o a la escuela. Revise las vacunas que su hijo necesita según el grado escolar al que asistirá este año.

VACUNAS	Prekinder [sala de cuidado infantil, Head Start, guardería, sala de 3 o prekinder]	Kinder (5.º grado)	6.º a 11.º grado	12.º grado
Difteria, tétanos y los ferina (DTaP, por sus siglas en inglés)	4 dosis	5 dosis	3 dosis	
Refuerzo contra tétanos, difteria y los ferina (Tdap, por sus siglas en inglés)				1 dosis (a partir de los 11 años)
Poliomielitis (IPV/OPV, por sus siglas en inglés)	3 dosis	4 dosis	4 dosis	3 dosis
		o 3 dosis si la tercera dosis se administró a los 4 años o más	o 3 dosis SÓLO si la tercera dosis se administró a los 4 años o más	
Sarampión, paperas, rubéola (MMR, por sus siglas en inglés)	1 dosis		2 dosis	
Hepatitis B	3 dosis	3 dosis	3 dosis	
			o 2 dosis de la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax HB) si las dosis se administraron en intervalos de, por lo menos, 4 meses entre los 11 y 15 años	
Varicela	1 dosis		2 dosis	1 dosis
Antimeningocócica conjugada (MenACWY, por sus siglas en inglés)			7.º, 8.º, 9.º y 10.º grado: 1 dosis	2 dosis
				o 1 dosis SÓLO si la primera dosis se administró a los 16 años o más
Haemophilus influenzae tipo b conjugada (Hib):	De 1 a 4 dosis			
	Depende de la edad del niño y de las dosis que recibió previamente			
Antineumocócica conjugada (PCV, por sus siglas en inglés)	De 1 a 4 dosis			
	Depende de la edad del niño y de las dosis que recibió previamente			
Influenza	1 dosis			

La cantidad de dosis de vacunas que su hijo necesita puede variar en función de la edad y de las vacunas que le administraron previamente. Es probable que su hijo necesite vacunas o dosis adicionales si tiene ciertas condiciones médicas. Si tiene preguntas, hable con su médico. Para obtener más información, llame al 311 o visite nyc.gov/health y busque "student vaccines" (vacunas para estudiantes).

