

المتطلبات الطبية للتلاميذ الجدد بالمدارس (مراكز رعاية الأطفال والمدارس العامة والخاصة والأبرشية)

يجب على جميع التلاميذ الملتحقين بمدرسة من مدارس مدينة نيويورك لأول مرة أن يخضعوا

لفحص طبي شامل وجميع التطعيمات المطلوبة

يجب توثيق هذا الفحص الطبي الشامل في استمارة الفحص الطبي للأطفال والمراهقين (CH205)، ويجب أن يشمل الفحص ما يلي:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| ✓ تقييم التغذية | ✓ الوزن |
| ✓ فحص النظر | ✓ الطول |
| ✓ فحص السمع | ✓ مؤشر كتلة الجسم (BMI) |
| ✓ فحص الأسنان | ✓ ضغط الدم |
| ✓ تقييم النمو | ✓ السجل الطبي |

من أجل مراكز رعاية الأطفال فقط:

فحص فقر الدم (الهيماتوكريت أو الهيموغلوبين)

فحص وتقييم التسمم من الرصاص

- يجب على جميع الأطفال الذي يقل سنهم عن 6 سنوات أن يخضعوا لفحص سنوياً لتقييم تعرضهم للتسمم بالرصاص.
- من المطلوب إجراء فحص لمستوى معدن الرصاص في الدم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنة واحدة إلى سنتين، وكذلك الأطفال الآخرين الذين تصل أعمارهم إلى 6 سنوات والمعرضين لخطر التسمم بمعدن الرصاص أو الذين لا توجد وثيقة تثبت خضوعهم للفحص.
- لمزيد من المعلومات، اتصلوا ببرنامج الوقاية من التسمم بمعدن الرصاص على الرقم 311.

يجب على الطلاب المنتقلين إلى صف الروضة من صف ما قبل الروضة تقديم نسخة جديدة من استمارة الفحص الطبي للأطفال والمراهقين (CH 205)

رقم الاتصال بمكتب عموم المدينة لشؤون الصحة المدرسية
لجميع المناطق التعليمية، من 1 إلى 23،
(347) 396-4597، (347) 396-4503.

سبتمبر/أيلول 2013

متطلبات التطعيم لجميع التلاميذ

إدارة الصحة البدنية والعقلية لمدينة نيويورك

متطلبات التطعيمات التالية هي مطلوبة بموجب القانون. يتعين فصل إبعاد الأطفال من المدرسة إذى لم يستوفوا هذه المتطلبات.

بالنسبة لجميع التلاميذ الذين يتراوح سنهم بين شهرين وثمانين عشر سنة.

يتعين أن يحتوي سجل تطعيمات الطفل على جميع التطعيمات التالية حتى يتم اعتباره حاصلًا على جميع التطعيمات. يتعين تقييم سجلات التطعيمات الخاصة بالتلاميذ حسب الصف الذي يداومون فيه خلال العام الدراسي.

متطلبات تتطلب الالتزام الكلي بها

عدد الجرعات	الصفوف من 1 إلى 12	عدد الجرعات	رياض الأطفال/صف ما قبل الروضة
3	لقاح DTaP، DTP، DT، Td (لتيتانوس-الدفثيريا) أو لقاح Tdap (التيتانوس-الدفثيريا-السعال الديكي غير الخلوي) ...	4	لقاح DTaP (الدفثيريا-التيتانوس-السعال الديكي غير الخلوي) أو لقاح DTP (الدفثيريا-التيتانوس-السعال الديكي) ...
1	لقاح (Tdap) ... لجميع الأطفال في الصفوف من الثاني عشر من مواليد من السادس بعد 1 يناير/كانون الثاني، 1994.	3	لقاح IPV (لقاح شلل الأطفال المعطل) أو لقاح OPV (لقاح شلل الأطفال) ...
3	لقاح (IPV) أو (OPV) ...	1	لقاح MMR (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) ...
2	لقاح (MMR) ... جرعة واحدة عند بلوغ السنة الأولى أو بعدها، إضافة إلى جرعة ثانية من لقاح يحتوي على الحصبة (من المفضل على شكل لقاح MMR) تُعطى بعد 28 يوماً أو أكثر على الأقل من إعطاء الجرعة الأولى.	3	لقاح Hib (انفلونزا الحمى الدوية من نوع ب) ...
# 3	التهاب الكبد B ... (يمكن للتلاميذ في سن 11-15 سنة تلقي جرعتين من لقاح (Merck Recombivax HB®) للبالغين، على أن يفصل بين الجرعتين 4 أشهر على الأقل لتلبية هذا المطلب. يتعين أن تحدد المستندات بوضوح اسم المنتج وقوة الجرعات.)	3	التهاب الكبد ب ...
*1	الجديري المائي ... لجميع الأطفال الذين هم من مواليد 1 يناير/كانون الثاني، 1994 أو بعده، جرعة واحدة عند بلوغ السنة الأولى أو بعدها.	1	الجديري المائي ...
	* ومع أن المطلوب هو جرعة واحدة فقط من لقاح الجديري، نوصي بحصول جميع الأطفال على جرعتين من لقاح يشتمل على الجديري.	3	لقاح المكورات الرئوية (PCV) ...
#	استخدام الأسماء التجارية للتطعيمات لا يعني مصادقة إدارة الصحة البدنية والعقلية لمدينة نيويورك عليها.	1	جميع الأطفال من مواليد 1 يناير/كانون الثاني، 2008 أو بعده حسب ما يناسب سنهم.
			صف الروضة
		4	لقاح (DTaP) أو (DTP) ...
		3	لقاح (IPV) أو (OPV) ...
		2	لقاح (MMR) ...
		3	التهاب الكبد ب ...
		*1	الجديري المائي ...

متطلبات القبول المشروط

يمكن للتلاميذ الجدد الالتحاق بالمدرسة بصورة مشروطة بتقديم وثائق تثبت الحصول على هذه السلسلة الأولية من التطعيمات على الأقل خلال الشهرين السابقين للتقديم، ويتعين أن تكون كما يلي: (1) عدم مرور أكثر من شهرين بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية، وعدم مرور أكثر من 6 أشهر بين الجرعة الثانية والجرعة الثالثة من لقاحات الدفثيريا وشلل الأطفال والتهاب الكبد B، و(2) عدم مرور أكثر من شهرين بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية من لقاح الحصبة المستقل، وبنفس لقاح (MMR). يتعين على التلاميذ أكمل السلسلة بكاملها بموجب القانون. التلاميذ الذين لم يحصلوا على التطعيمات خلال فترة القبول المشروطة يتعين إصدار خطابات إبعاد لهم لإبعادهم عن المدرسة حتى يمتثلوا لهذه المتطلبات.

عدد الجرعات	صف الروضة والصفوف من 1 إلى 12	عدد الجرعات	مراكز الرعاية/ما قبل صف الروضة
1	لقاح DTaP، DTP، DT، Td (لتيتانوس-الدفثيريا) أو لقاح Tdap (التيتانوس-الدفثيريا-السعال الديكي غير الخلوي) ...	1	لقاح DTaP (الدفثيريا-التيتانوس-السعال الديكي غير الخلوي) أو لقاح DTP (الدفثيريا-التيتانوس-السعال الديكي) ...
1	لقاح (Tdap) ... لجميع الأطفال في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر، من مواليد 1 يناير/كانون الثاني، 1994، أو بعد ذلك.	1	لقاح IPV (لقاح شلل الأطفال المعطل) أو لقاح OPV (لقاح شلل الأطفال الفموي) ...
1	لقاح (IPV) أو (OPV) ...	1	لقاح MMR (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) ...
1	لقاح (MMR) ...	1	لقاح Hib (الأنفلونزا النزلية من النوع ب) ...
1	التهاب الكبد ب ...	1	التهاب الكبد ب ...
1	الجديري المائي ...	1	الجديري المائي ...
1	جميع الأطفال الذين هم من مواليد 1 يناير/كانون الثاني، 1994 أو بعده، جرعة واحدة عند بلوغ السنة الأولى أو بعدها.	1	المكورات الرئوية (PCV) ...

لمزيد من المعلومات حول التطعيم أو لإيجاد مكان لتطعيم طفلكم، اتصلوا برقم هاتف الاستعلامات 311. للحصول على مزيد من المعلومات حول الجدول المحدث المقترح للتطعيمات، فم زيارة الرابط:

<http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html>